

LA FAUNE DE NOS VIGNES ET DES CABINETS D'VIGNE

Auteurs :

- GUITARD Gilbert, I.T.A. - LEGTA 36, Confrérie des Culs d'Ours
- BOURGUEMESTRE François, Technicien Cynégétique - F.D.C.I. 36
- RAYNARD Philippe, D.E.S.S Aménagement - LEGTA 36
- MACHILLOT Daniel, Confrérie des Culs d'Ours

Les maisonnettes constituent un lieu de refuge et de gagnage pour bon nombre d'oiseaux et de mammifères, d'autant que les abords immédiats du bâtiment plantés de treilles ou d'arbustes caducs (fruitiers) ou persistants (conifères, buis) complètent en le diversifiant, l'attrait du site.

Parmi les mammifères insectivores, les **chauve-souris** (ordre des chiroptères) notamment la **pipistrelle commune** (*Pipistrellus pipistrellus*) élisent volontiers domicile dans ces loges ou règnent le plus souvent une atmosphère humide et l'obscurité .

Des **souris** (*Mus musculus*) sont fréquemment observées ainsi que des **loirs** (*Glis glis*), des **mulots** (*Apodemus sylvaticus*), des **lérots** (*Eliomys quercinus*), des **chats errants** (*Felis domestica*), des **belettes** (*Mustela nivalis*), des **fouines** (*Martes foina*) ou des **martres** (*Martes martes*) dans les combles. Les **lapins de garenne** (*Oryctolagus cuniculus*) affectionnent ces abris et creusent souvent leurs galeries en bordure, à même le sol à l'intérieur, voire carrément sous le dallage s'il existe.

Les **hérissons d'Europe** (*Erinaceus europaeus*) logent souvent sous des fagots de sarments entassés près des loges.



Lapin de garenne



Rouge-queue noir

Les oiseaux les plus familiers sont le **rouge-gorge** (*Erithacus rubecula*), toujours curieux et qui fait souvent un brin d'accueil lorsque vous ouvrez la maisonnette. Les **hirondelles de cheminées** (*Hirundo rustica*) nichent sous les solives si par malheur une vitre de la fenêtre est cassée, et les **mésanges bleues** (*Parus caeruleus*) et **charbonnières** (*Parus major*) et les **rouges-queues noirs** (*Phoenicurus ochrurus*) et à **front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) installent leurs nids facilement là où les pierres sont disjointes et le crépi troué.

On signale quelques nidifications de **chouettes effraies** (*Tyto alba*)... La dame blanche aime squatter les combles ...

Merles noirs (*Turdus merula*) et **grives musiciennes** (*Turdus philomelos*) peuvent nicher dans les arbres situés près de la loge ainsi que les **troglodytes** (*Troglodytes troglodytes*), les **accenteurs mouchets** (*Prunella modularis*), les **rossignols philomèles** (*Luscinia megarhynchos*) et les **fauvettes des jardins** (*Sylvia borin*) ou à **têtes noires** (*Sylvia atricapilla*).



Grive musicienne



Rainette verte

Abris, constructions en bois ou en pierre, végétalisation des abords, présence de proies, si une friche ou un bois côtoient le cabinet de vigne, gare aux reptiles. La plus communes, la **couleuvre verte et jaune** (*Coluber viridiflavus*) est totalement inoffensive mais méfiez-vous des **vipères-aspics** (*Vipera aspis*).

On peut rencontrer également des **crapauds communs** (*Bufo bufo*), des **lézards verts** (*Lacerta viridis*) et des **murailles** (*Podarcis muralis*), l'**orvet** (*Anguis fragilis*) et la **rainette verte** (*Hyla arborea*).

La vigne et les autres végétaux ligneux ou herbacés cultivés ou adventifs qui croissent avec elle, constituent un milieu favorable à la macro-faune qui s'y abrite, s'y nourrit, et s'y multiplie.

♣ INSECTES

♣ Coléoptères



Dans la famille des Scarabées, on peut rencontrer dans les vignes le **Hanneton commun** (*Melolontha melolontha*) dont les larves connues sous le nom de vers blancs rongent les racines.

Dans la famille des Elatériidées, les **Taupins** (*Agriotes*) dont la larve fortement chitinisée est appelée ver fil de fer.

La famille des Chrysomélidées est représentée par l'**Altise** ou **Puce de vigne** (*Altica ampelophaga*).

La famille des Attélabidées comprend une espèce curieuse : le **Cigarier de la vigne** (*Byctiscus betulae*) Ce petit charançon vert, bleu, violet crible les feuilles de piqûres irrégulières.

Vers de la grappe

Sous ce vocable, on désigne généralement la **Cochylis** ou **Teigne des raisins** (*Eupoecilia ambiguella*), l'**Eudemis** (*Lobesia botrana*) et la **Pyrale** (*Sparganothis pilleriana*). Ces tordeuses ne s'attaquent qu'aux inflorescences et aux grappes et favorisent le développement d'une maladie cryptogamique appelée pourriture grise ou pourriture noble.



Noctuelles

Papillons polyphages, connus des vignerons sous le nom de vers gris. On rencontre dans les vignobles la **Noctuelle des moissons** (*Scotia segetum*), la **Noctuelle point d'exclamation** (*Scotia exclamacionis*) et la **Noctuelle fiancée** (*Tryphaena pronuba*).

Chenilles bourruées

Deux chenilles facilement identifiables à leurs longs poils noirs qui recouvrent leurs corps, elles appartiennent à la famille des Arctiidées et il s'agit de l'**Ecaille martre** (*Artia cagia*) et de l'**Ecaille fermière** (*Artia villica*).

Sphinx de la vigne

Très beaux papillons de 5 à 10 cm d'envergure reconnaissables à leurs corps énormes par rapport au faible développement de leurs ailes. Leurs grosses chenilles peuvent atteindre 6 à 9 cm de long. Trois espèces s'attaquent à la vigne : le **Sphinx rose de la vigne** (*Pergesa elpenor*), le **Sphinx pourceau** (*Pergesa porcellus*) et les **Sphinx communs de la vigne** (*Selerio lineata*).

Cecidomyie

Deux espèces de diptères qui attaquent les feuilles ou la grappe (*Dichelomyia oenophila* et *Contarinia viticola*).

On peut ajouter également les insectes typiques des sols partiellement nus et secs . **Cicindèles champêtres** (*Cicindela campestris*), **Bourdons terrestres** (*Bombus terrestris*), **Abeilles solitaires** (*Osmia coerulescens*) nichant au sol, **Guêpes communes** (*Paravespula vulgaris*) et **Frelons** (*Vespa crabro*), consommateurs de fruits mûrs et nichant sous les toits...

On peut rencontrer également le **Criquet brun** (*Chorthippus brunneus*), des **Grandes sauterelles vertes** (*Tettigonia viridissima*) et le **Forficule** ou **Perce-oreille** (*Chelidurella acanthopygia*).

♣ ARACHNIDES

On peut évoquer pour mémoire des Acariens comme l'**Erinose** (*Eriophyes vitis*) et les **Araignées rouges** (*Panonychus ulmi*) et **jaunes** (*Eotetranychus carpini*).