

## ♣ MAMMIFERES

Cultivée sur des terrains sains et filtrants se réchauffant vite au printemps, on y trouve bien entendu des **Campagnols des champs** (*Microtus arvalis*), mais aussi des **Lapins de garenne** (*Oryctolagus cuniculus vulgare*) et des **Lièvres** (*Lepus capensis*) dont les dégâts se caractérisent par le sectionnement de sarments.



Les **Musaraignes communes** (*Sorex araneus*) et les **Hérissons d'Europe** (*Erinaceus europaeus*) fréquentent les vignes, attirés par les insectes et divers invertébrés.

Enfin, depuis l'explosion récente de leurs populations, les **Chevreuils** (*Capreolus*) par abrutissement au printemps, et les **Sangliers** (*Sus scrofa*) avant les vendanges, peuvent faire des dégâts considérables.




## ♣ LES OISEAUX

Au cours de la taille hivernale, le vigneron pourra observer des espèces qui viennent se nourrir :

- soit de graines de mauvaises herbes (**Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) que l'on appelait en Berry l'Ardenais car initialement dénommé Pinson des Ardennes, **Verdiers d'Europe** (*Carduelis chloris*), **Chardonnerets élégants** (*Carduelis carduelis*) qui tirent leur nom des chardons, **Pinsons des arbres** (*Fringilla coelebs*), **Bruants jaunes** (*Emberiza citrinella*) et **zizis** (*Emberiza cirius*)) ;


- soit en grattant sous les feuilles au pied des ceps ;

- soit en picorant les pommes et les poires des fruitiers de plein vent (**Grives litornes** ou tia-tia (*Turdus pilaris*), **mauvis** (*Turdus iliacus*) et **musiciennes** (*Turdus philomelos*) que l'on appelle aussi vendangeuses, **Merles noirs** (*Turdus merula*), et quelquefois le rare, méfiant et querelleur **Gros-bec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) lors d'un coup de froid intense).



Au printemps, notamment lorsque la vigne est bien débourrée, des espèces nicheuses s'installent dans la végétation des ceps (**Linottes mélodieuses** (*Carduelis cannabina*) ou **Linotte des vignes**, **Bruants** dont le mythique **ortolan** (*Emberiza hortulana*), joyau de la gastronomie landaise et provençale, oiseau protégé mais que l'on déguste toujours y compris à la table des plus grands de ce monde avec un cérémonial, que dis-je ! avec un rite papal, à la manière des romains qui déjà l'élevaient et l'engraissaient pour le sacrifier lors de leurs festins). D'autres espèces installent leurs nids sur le sol et sur le rang (**Perdrix grises** (*Perdix perdix*) et **rouges** (*Alectoris rufa*)) et dans les troncs

de vieux pêchers (espèces cavernicoles comme la **Huppe fasciée** (*Upupa epops*), les **Etourneaux sansonnets** (*Sturnus vulgaris*), les **Mésanges** (*Parus*), le **Pic vert** (*Picus viridis*), le **Torcol fourmilier**



(*Jynx torquilla*), la **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) et le **Hibou petit-duc** (*Otus scops*)) soit dans les branches des arbres de plein vent plantés dans la vigne **Loriot d'Europe** ou merle d'or (*Oriolus oriolus*)).

Le **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) se perche souvent sur les fils et piquets de vigne.

Si les fruitiers sont nombreux, vous pourrez rencontrer le merveilleux et rutilant **Bouvreuil pivoine** (*Pyrrhula pyrrhula*) dont le bec est une véritable machine à ébourgeonner.

Aïe ... aïe ... aïe ... la terreur des arboriculteurs dégage aussi sans vergogne dans les vignes fruitières du Bas-Berry.

L'automne lorsque les raisins mûrissent des escadrilles de sansonnets et de **grives musiciennes** et **mauvis** vendangent bien avant et souvent de longues semaines après la récolte des grappes par le vigneron et ses amis.



**Traquet pâtre**



Le **Faisan commun** (*Phasianus colchicus*) qui raffole de baies rouges est aussi un hôte assidu des vignes, tout comme le **Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) en migration qui grappille plutôt par petits groupes. L'époque où le **Cochevis huppé** (*Galerida cristata*) venait gratter le crottin de cheval ou d'âne est bien révolu mais on observe cependant toujours cet alaudidea ainsi que des **Moineaux domestiques** (*Passer domesticus*) et **friquets** (*Passer montanus*).

On a observé à Beauregard, également, une **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) appelée communément lavandière ou hochequeue dans l'allée centrale ainsi qu'un **Busard cendré** (*Circus pygargus*), des **Buses variables** (*Buteo buteo*) et au dessus des vignes, le vol en saint-esprit du **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) emblème du département de l'Indre.

#### ♣ MOLLUSQUES (genre Helix)

Les escargots sont polyphages, hermaphrodites et de mœurs nocturnes. On peut trouver les espèces suivantes : **Escargot de Bourgogne** ou **Escargot des vignes** (*Helix pomatia*), **Escargot variable** (*Helix variabilis*), **Petit gris** ou **Escargot chagriné** (*Helix aspersa*). Ils sont tous voraces et peuvent occasionner des dégâts importants en début de végétation de la vigne et en l'absence d'enherbement.



**La linotte des vignes**



FONDATION  
POUR LA  
PROTECTION  
DES HABITATS  
DE LA FAUNE  
SAUVAGE

